

Total No. of Printed Pages—24

**5 SEM FYUGP MTHC (5C1/
5C2/5C3/5C4)**

2 0 2 5

(November)

MATHEMATICS

(Core)

Paper : MTHC5C

*The figures in the margin indicate full marks
for the questions*

Paper : MTHC5C1

(Linear Programming)

Full Marks : 60

Time : 2 hours

1. (a) বৈখিক প্রক্রমণ সমস্যা এটাৰ উপাংশ চাৰিটা কি কি? 1

What are the four components of a linear programming problem?

(b) শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখা : 1

যদি কোনো বৈখিক প্রক্রমণ সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান থাকে, তেন্তে অন্তত এটা মৌলিক সম্ভাৰ্য সমাধান সর্বোত্তম হ'বই।

(2)

State True or False :

If an LPP has an optimal solution, then at least one basic feasible solution must be optimal.

- (c) n টা সিদ্ধান্ত চলকবিশিষ্ট আৰু m টা সীমিত চৰ্তবিশিষ্ট বৈখিক প্ৰক্ৰমণ সমস্যাব বাবে সৰ্বোচ্চ কিমানটা মৌলিক সম্ভাৰ্য সমাধান থাকিব ?

1

What is the maximum number of basic feasible solutions for an LP problem with n numbers of decision variables and m numbers of constraints?

- (d) বৈখিক প্ৰক্ৰমণ সমস্যা এটাৰ প্ৰামাণিক ৰূপটো মৌলিকৰ সহায়ত লিখি উলিওৱা।

2

Write the standard form of an LPP in matrix notation.

- (e) ছিমপ্লেক্স প্ৰণালীৰ সহায়ত তলৰ বৈখিক প্ৰক্ৰমণ সমস্যাটো সমাধান কৰা :

5

Solve the following LPP using simplex method :

সৰ্বোচ্চ মান নিৰ্ণয় কৰা (Maximize)

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

যাতে (subject to)

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1 - x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

26P/312

(Continued)

(3)

- (f) দুই-স্তৰ পদ্ধতি বা two-phase পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ বৈখিক প্ৰক্ৰমণ সমস্যাটো সমাধান কৰা :

9

Solve the following LPP using two-phase method :

সৰ্বনিম্ন মান নিৰ্ণয় কৰা (Minimize)

$$Z = 5x_1 + 8x_2$$

যাতে (subject to)

$$3x_1 + 2x_2 \geq 3$$

$$x_1 + 4x_2 \geq 4$$

$$x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

অথবা / Or

Big-M পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি সমাধান কৰা :

Solve by Big-M method :

সৰ্বোচ্চ মান নিৰ্ণয় কৰা (Maximize)

$$Z = x_1 + 2x_2$$

যাতে (subject to)

$$x_1 - 5x_2 \leq 10$$

$$2x_1 - x_2 \geq 2$$

$$x_1 + x_2 = 10$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

26P/312

(Turn Over)

(4)

2. (a) সত্য নে অসত্য লিখা : 1
State True or False :

যদি প্রাথমিক সমস্যাটো সীমাবদ্ধ নহয়, তেন্তে দ্বৈত সমস্যার উদ্দেশ্য ফলনৰ সসীম মান থাকিব।

If the primal problem is unbounded, the dual may have finite value of the objective function.

(b) “দ্বৈতৰ দ্বৈত হ’লে প্রাথমিক হৈ যায়।” তলৰ বৈখিক প্রক্রমণ সমস্যাটোৰ বাবে ওপৰৰ বক্তব্যটোৰ সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰা : 4

“The dual of the dual is the primal.”
Verify the statement for the following LPP :

সৰ্বোচ্চ মান নিৰ্ণয় কৰা (Maximize)

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

যাতে (subject to)

$$2x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

অথবা / Or

(i) বৈখিক প্রক্রমণ সমস্যার ক্ষেত্রে প্রাথমিক-দ্বৈত সম্পর্কৰ বাবে পূৰ্বক শিথিলতাৰ ধর্মটো লিখা। 1

Write the complementary slackness property for primal-dual relationship in LPP.

(5)

(ii) অন্তর্নিহিত দ্বৈত বৈখিক প্রক্রমণ সমস্যার সৈতে কেনেদৰে জড়িত? 1

How does the shadow price relate to the dual of an LP problem?

(iii) এটা বৈখিক প্রক্রমণ সমস্যার প্রামাণিক প্রাথমিক রূপ বুলিলে কি বুজা? 2

What do you mean by standard primal form of an LPP?

(c) তলৰ বৈখিক প্রক্রমণ সমস্যাটো দ্বৈত রূপত লিখা : 6
Find the dual of the following LPP :

সৰ্বনিম্ন মান নিৰ্ণয় কৰা (Minimize)

$$Z = x_1 - 3x_2 - 2x_3$$

যাতে (subject to)

$$3x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 7$$

$$2x_1 - 4x_2 \geq 12$$

$$-4x_1 + 3x_2 + 8x_3 = 10$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

আৰু x_3 চিহ্নৰ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নহয়।

and x_3 is unrestricted in sign.

3. (a) m টা উৎসযুক্ত আৰু n টা গন্তব্যস্থানযুক্ত পৰিবহন সমস্যা এটাত থকা চলক আৰু সীমিত চৰ্তৰ সংখ্যা উল্লেখ কৰা। 1

Write the number of constraints and number of variables in a transportation problem with m sources and n destinations.

(6)

- (b) পৰিবহন সমস্যাৰ এখন তালিকাৰ বাবে loop ৰ সংজ্ঞা আগবঢ়োৱা।

Define loop in a transportation table.

- (c) নিম্নতম খৰচ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ পৰিবহন সমস্যাটোৰ প্ৰাৰম্ভিক মৌলিক সম্ভাৱ্য সমাধান নিৰ্ণয় কৰা :

Use least cost method (LCM) to find initial basic feasible solution to the following transportation problem :

	D_1	D_2	D_3	D_4	Supply
S_1	19	30	50	10	7
S_2	70	30	40	60	9
S_3	40	8	70	20	18
Demand	5	8	7	14	

অথবা / Or

পৰিবহন সমস্যাৰ প্ৰাৰম্ভিক মৌলিক সম্ভাৱ্য সমাধান নিৰ্ণয়ৰ বাবে ভ'গেলৰ আনুমানিকতাৰ পদ্ধতিটো আলোচনা কৰা।

Discuss the Vogel's approximation method (VAM) to find initial basic feasible solution of a transportation problem.

26P/312

(Continued)

(7)

- (d) তলৰ বৰ্টন সমস্যাটো সমাধান কৰা আৰু ইয়াৰ আটাইবোৰ সৰ্বোত্তম সমাধান নিৰ্ণয় কৰা : $6+1=7$

Solve the following assignment problem and find all the optimal assignments :

	A	B	C	D	E
I	9	8	7	6	4
II	5	7	5	6	8
III	8	7	6	3	5
IV	8	5	4	9	3
V	6	7	6	8	5

4. (a) সত্য নে অসত্য লিখা :

State True or False :

দুজন ব্যক্তি থকা শূন্য-যোগ খেলত পৰ্যায় বিন্দু বা saddle point সদায়ে পোৱা যায়।

In a two-person zero-sum game, a saddle point always exists.

- (b) নূনতম-সৰ্বাধিক নীতি ব্যৱহাৰ কৰি 'সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কৌশল' ব্যাখ্যা কৰা। খেল তত্ত্ব বা গেম থিয়ৰীত খেল বা গেম মানে কি ? $1+1=2$

Explain the 'best strategy' on the basis of minimax principle. What is a game in game theory?

- (c) A য়ে একে সময়তে দুটা মুদ্ৰা টুছ কৰিছে। যদি দুয়োটা মুদ্ৰাতে মুণ্ড পৰে তেন্তে A য়ে লাভ কৰে 2 টকা আৰু যদি দুয়োটা মুদ্ৰাতে পুচ্ছ পৰে তেন্তে A য়ে লাভ কৰে

26P/312

(Turn Over)

(8)

3 টকা। আকৌ যদি এটা মুণ্ড আৰু এটা পুছ পৰে, তেন্তে A য়ে 1 টকা হেৰুৱাই। খেলটোৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

4

A tosses two coins at a time. He receives ₹ 2 and ₹ 3 for two heads and two tails respectively and he losses ₹ 1 for one head and one tail. Find the value of the game.

(d) লেখ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ গেমটোৰ মান নিৰ্ণয় কৰা :

8

Use the graphical method for solving the following game :

Player A	Player B			
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
A ₁	2	2	3	-2
A ₂	4	3	2	6

অথবা / Or

তলৰ খেলৰ সমস্যাটোক বৈখিক প্ৰক্ৰমণলৈ পৰিবৰ্তন কৰি সমাধান কৰা :

Solve the following game problem by converting it into an LPP :

$$\begin{array}{cc} & B_1 & B_2 \\ A_1 & \begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix} \\ A_2 & \begin{bmatrix} -1 & 2 \end{bmatrix} \end{array}$$

26P/312

(Continued)

(9)

Paper : MTHC5C2

(Mathematical Methods)

Full Marks : 60

Time : 2 hours

1. (a) সত্য নে অসত্য লিখা :

1

State True or False :

যদি $f(x)$ ফলন এটা $(-\pi, \pi)$ ত যুগ্ম হয়, ইয়াৰ ফুৰিয়েৰ সম্প্ৰসাৰণত কেৱল ক'চাইন পদ থাকিব।

If a function $f(x)$ is even in $(-\pi, \pi)$, its Fourier series expansion contains only cosine terms.

(b) $(a, a+2\pi)$, $a \in R^+$ অন্তৰালত $f(x)$ ফলনৰ ফুৰিয়েৰ শ্ৰেণীৰ সংজ্ঞা দিয়া।

2

Define Fourier series of a function $f(x)$ in the interval $(a, a+2\pi)$, $a \in R^+$.

(c) $[0, \pi]$ অন্তৰালত $f(x) = \pi - x$ ফলনৰ অৰ্ধ-পৰিসৰ ক'চাইন শ্ৰেণী উলিওৱা।

4

Find the half-range cosine series of the function $f(x) = \pi - x$ in the interval $[0, \pi]$.

2. (a) (i) $L\{1\}$ আৰু (ii) $L\{e^{-at}\}$ ৰ মান লিখা। 1+1=2

Write the values of (i) $L\{1\}$ and (ii) $L\{e^{-at}\}$.

26P/312

(Turn Over)

(10)

(b) যদি $L\{F(t)\} = f(s)$ আৰু $L\{G(t)\} = g(s)$, তেন্তে
প্রমাণ কৰা যে

$$L\{c_1 F(t) + c_2 G(t)\} = c_1 f(s) + c_2 g(s) \quad 3$$

If $L\{F(t)\} = f(s)$ and $L\{G(t)\} = g(s)$, then
prove that

$$L\{c_1 F(t) + c_2 G(t)\} = c_1 f(s) + c_2 g(s)$$

(c) মান নিৰ্ণয় কৰা : 3

Find :

$$L\{te^{at} \sin at\}$$

(d) যদি $L\{F(t)\} = f(s)$, তেন্তে প্রমাণ কৰা যে

$$L\{F(at)\} = \frac{1}{a} f\left(\frac{s}{a}\right) \quad 3$$

If $L\{F(t)\} = f(s)$, then prove that

$$L\{F(at)\} = \frac{1}{a} f\left(\frac{s}{a}\right)$$

(e) যদি $L\left\{2\sqrt{\frac{t}{\pi}}\right\} = \frac{1}{s^{3/2}}$, তেন্তে দেখুওৱা যে

$$L\left\{\frac{1}{\sqrt{t\pi}}\right\} = \frac{1}{\sqrt{s}} \quad 4$$

If $L\left\{2\sqrt{\frac{t}{\pi}}\right\} = \frac{1}{s^{3/2}}$, then show that

$$L\left\{\frac{1}{\sqrt{t\pi}}\right\} = \frac{1}{\sqrt{s}}$$

26P/312

(Continued)

(11)

অথবা / Or

মান নিৰ্ণয় কৰা :

Find :

$$L\left\{\int_0^t e^{-t} \cos t \, dt\right\}$$

3. (a) মান লিখা : 1

Write the value of

$$L^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + a^2}\right\}$$

(b) তলত দিয়াবোৰৰ মান নিৰ্ণয় কৰা (যি কোনো এটা) : 3

Find the following (any one) :

$$(i) L^{-1}\left\{\frac{3s+1}{s^2 - 2s - 3}\right\}$$

$$(ii) L^{-1}\left\{\frac{3}{(s-3)^2 + 3^2}\right\}$$

(c) কনভলুচন উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি মান উলিওৱা : 4

Apply convolution theorem to evaluate

$$L^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)(s+2)^2}\right\}$$

26P/312

(Turn Over)

(12)

অথবা / Or

মান উলিওৱা :

Evaluate :

$$L^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+1)^2(s^2+4)} \right\}$$

4. (a) ফুৰিয়েৰ ক'চাইন অনুকলন ৰূপান্তৰৰ বিষয়ে লিখা। 1

Write the Fourier cosine integral transformation.

(b) ফুৰিয়েৰ ৰূপান্তৰৰ বাবে ডিৰিচলেটৰ চৰ্তসমূহৰ বিষয়ে লিখা। 2

Write the Dirichlet's conditions for Fourier transformation.

(c) ফুৰিয়েৰ ৰূপান্তৰৰ শিফটিং ধৰ্ম প্ৰমাণসহকাৰে ব্যাখ্যা কৰা। 4

State and prove the shifting property of Fourier transformation.

অথবা / Or

মডুলেচন উপপাদ্য প্ৰমাণসহকাৰে ব্যাখ্যা কৰা।

State and prove the modulation theorem.

(d) $f(x) = xe^{-x}$, $0 \leq x \leq \infty$ ৰ ফুৰিয়েৰ ৰূপান্তৰ উলিওৱা। 6

Find the Fourier transformation of $f(x) = xe^{-x}$, $0 \leq x \leq \infty$.

(13)

অথবা / Or

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases} \text{ ৰ ফুৰিয়েৰ ৰূপান্তৰ উলিওৱা।}$$

Find the Fourier transformation of

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$$

(e) $f(x) = \frac{e^{-ax}}{x}$ ৰ ফুৰিয়েৰ চাইন ৰূপান্তৰ উলিওৱা আৰু

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \sin px \, dx = \tan^{-1} \left(\frac{p}{a} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{p}{b} \right)$$

নিৰ্ণয় কৰা। 6

Find Fourier sine transform $f(x) = \frac{e^{-ax}}{x}$

and deduce that

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \sin px \, dx = \tan^{-1} \left(\frac{p}{a} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{p}{b} \right)$$

অথবা / Or

$F(p) = e^{-|p|y}$ ৰ ফুৰিয়েৰ বিপৰীত ৰূপান্তৰ $f(x)$ উলিওৱা।

Find the inverse Fourier transform $f(x)$ of $F(p) = e^{-|p|y}$.

(14)

5. (a) $L\left\{\frac{\partial y}{\partial t}\right\}$ ৰ মান লিখা।

1

Write the value of $L\left\{\frac{\partial y}{\partial t}\right\}$.

(b) যদি $Y = Y(x, t)$, তেন্তে প্রমাণ কৰা যে

$$L\left\{\frac{\partial Y}{\partial t}\right\} = py(x, p) - Y(x, 0)$$

য'ত $L\{Y(x, t)\} = y(x, p)$.

3

If $Y = Y(x, t)$, then prove that

$$L\left\{\frac{\partial Y}{\partial t}\right\} = py(x, p) - Y(x, 0)$$

where $L\{Y(x, t)\} = y(x, p)$.

(c) লাপলাছ কপান্তৰ ব্যৱহাৰ কৰি সমাধান কৰা (যি কোনো এটা) :

7

Solve using Laplace transform (any one) :

$$(i) \frac{d^2 y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} - 3y = \sin t; y = \frac{dy}{dt} = 0,$$

য'ত (when) $t = 0$

$$(ii) \frac{d^2 y}{dt^2} + 9y = \cos 2t; y(0) = 1, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

26P/312

(Continued)

(15)

Paper : MTHC5C3

(Financial Mathematics)

Full Marks : 60

Time : 2 hours

UNIT—I

1. (a) Define the concept of inflation. 2

(b) Compare compound interest and simple interest in the growth of wealth over time, in an investment. 3

(c) Explain the concept of risk aversion principle. 3

Or

Explain comparison principle with a hypothetical example.

(d) Suppose the cash flow stream $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_n)$ has $x_0 < 0$ and $x_k \geq 0$ for all $k = 1, 2, \dots, n$, with at least one term is strictly positive. Then prove that there is a unique positive root to the equation

$$x_n C^n + x_{n-1} C^{n-1} + \dots + x_2 C^2 + x_1 C + x_0 = 0$$

26P/312

(Turn Over)